ฐิติพร มะชิโกวา : ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองอายุสั้น: การแสดงออกและการถ่ายทอด (CHARACTERS ASSOCIATED WITH YIELD POTENTIAL OF EARLY MATURING SOYBEANS: EXPRESSION AND INHERITANCE)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ. คร. ใพศาล เหล่าสุวรรณ, 120 หน้า. ISBN 974-533-297-6.

ถั่วเหลืองอายุสั้นเหมาะสมที่จะใช้ปลูกในระบบการปลูกพืช เนื่องจากสามารถปลูกสลับกับ การปลูกข้าว หรือกับพืชไร่ชนิคอื่น ๆ อย่าง<mark>ไรก็</mark>ตาม พันธุ์อายุสั้นที่ปรับปรุงขึ้นในประเทศไทย และ ใช้ส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ผลผลิตต่ำกว่าพ<mark>ันธุ์ที่</mark>มีอายุยาว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ ้คือ เพื่อศึกษาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองที่มีอายุเก็บเกี่ยวต่างกัน และเพื่อ พัฒนาพันธุ์อายุสั้นให้มีผลผลิตสูงขึ้น โดย<mark>แ</mark>บ่งเป็น<mark>ก</mark>ารทดลองย่อย ๆ 5 การทดลอง ในการทดลองแรก ้เปรียบเทียบถั่วเหลืองที่มีอายุต่างกัน 6 <mark>พัน</mark>ธุ์ เมื่อให้<mark>ปุ๋</mark>ย 2 อัตรา คือ อัตราแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และสองเท่าของอัตราแนะนำ การท<mark>ดลอ</mark>งที่ 2 และ <mark>3 ท</mark>ำการเปรียบเทียบพันธุ์อายุสั้น อายุปานกลาง และอายุยาว เมื่อปลูกที่ความหน<mark>าแน่</mark>นต่าง ๆ การทดล<mark>องที่</mark> 4 เป็นการผสมกลับเพื่อถ่ายทอดลักษณะ จำนวนฝึกต่อต้นสูง จากพันธุ์ให้ (LJ4) ไปยังพันธุ์รับ (CM2, NS1, ST2) การทดลองที่ 5 เป็นการ ทคลองเพื่อขยายเวลาก่อนออกคอกของพันธ์อายสั้นให้ยาวขึ้น โคยยังมีอายเก็บเกี่ยวเท่าเคิม ทคลองนี้ได้ผสมข้ามพัน<mark>ธ์อา</mark>ยสั้น และอายปานกลาง กับพันธ์อ<mark>ายย</mark>าว แล้วทำการคัดเลือกโดยวิธีคัด หนึ่งเมล็ดต่อต้น ผลกา<mark>รทดล</mark>องที่ 1 พบว่าผลผลิตของทกพันธ์สงขึ้น เมื่อให้ป๋ยในอัตราสงกว่า ผล การทดลองที่ 2 และ 3 พบ<mark>ว่าผลผลิตต่อพื้นที่ของพันธุ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ</mark>้น เมื่อเพิ่มประชากรให้สูงขึ้น และ ้ยังพบว่าการให้ผลผลิตสูงเกี่ย<mark>วข้องกับการเพิ่มน้ำหนักแห้ง</mark> และเพิ่มจำนวนฝักต่อต้น ผลการทคลอง ที่ 4 พบว่าสายพันธุ์ผสมกลับที่กัดเลือกได้มีแนวโน้มที่จะให้จำนวนฝึกต่อต้น และให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์รับ การทคลองสุดท้ายพบว่าสามารถคัดเลือกโดยวิธีกัดหนึ่งเมล็ดต่อต้นเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มี อายุก่อนออกดอกยาวขึ้น และมีผลผลิตสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้การคัดหนึ่งเมล็ดต่อต้น และคัดเลือก สายพันธุ์ในชั่วหลัง ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าการคัดเลือกในชั่วต้น และสายพันธุ์เหล่านี้ยังมีลำ ต้นสูงใหญ่ และให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์อายุสั้นอีกด้วย

สาขาวิชาเทค โน โลยีการผลิตพืช	ลายมือชื่อนักศึกษา
ปีการศึกษา 2546	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

THITIPORN MACHIKOWA: CHARACTERS ASSOCIATED WITH YIELD POTENTIAL OF EARLY MATURING SOYBEANS: EXPRESSION AND INHERITANCE

THESIS ADVISOR: PROF. PAISAN LAOSUWAN, Ph. D. 120 PP. ISBN 974-533-297-6.

Early maturing variety of soybean is most suitable to the present crop production system in Thailand, since they can fit well in the productions of rice or certain field crops. However, most early varieties are relatively less productive than late maturing varieties. The objectives of this research were to evaluate characters associated with yield in different maturity types and to develop early varieties with favorable plant characters for higher yield. The first study was to compare six varieties of different maturing groups in two fertilizer rates including the recommended rate and double that of the recommended rate. The second and third studies, early, medium and late varieties were compared at different population densities. The fourth study was to use backcross method to transfer high pods per plant from donor parent (LJ4) to recurrent parents (CM2, NS1, ST2). The last experiment was conducted with the aim to extend the vegetative period without increasing days to maturity by crossing medium and late varieties with early ones. Single seed descent (SSD) selection was employed at the early and late generations. In the first study, it was found that higher fertilizer rate increased seed yield of all varieties. The second and third studies showed that the yield of early varieties was increased with higher population densities. The yield was found to be associated with increased dry matter and pods per plant. The fourth study showed that backcrossed lines tended to produce a higher number of pods per plant and higher yield than their respective recurrent parents. The last study showed that lines with longer vegetative periods and higher yields were successfully selected using early and late SSD. However, selected lines in late generation outyielded selections in early generation. These lines were also taller and gave higher yields than those of the early parents.

School of Crop Production Technology	Student's Signature
Academic Year 2003	Advisor's Signature